EFEITOS DO BETA-CARIOFILENO SOBRE A INFLAMAÇÃO E O ESTADO OXIDATIVO HEPÁTICO EM RATOS COM ARTRITE INDUZIDA POR ADJUVANTE

Camila de Lima Barizão (PIBIC/FA), Ana Paula Ames Sibin, Anacharis Babeto Sá-Nakanishi, Jurandir Fernando Comar (orientador), e-mail: jfcomar@uem.br.

Universidade Estadual de Maringá /Centro Ciências Biológicas/ Maringá, PR.

Área e subárea do CNPq/CAPES: Ciências Biológicas / Bioquímica

Palavras-chave: anti-inflamatório, estresse oxidativo, radicais livres.

Resumo:

O β -cariofileno é um sesquiterpeno natural com diversas propriedades terapêuticas, especialmente atividade anti-inflamatória. Este é o principal componente do óleo de copaíba, um dos principais fitoterápicos da Amazônia brasileira comercializado mundialmente. Recente estudo demonstrou que o óleo de copaíba (*Copaifera reticulata*) foi capaz de atenuar o estresse oxidativo hepático e inflamação em ratos com artrite por adjuvante. O presente trabalho avaliou os efeitos do tratamento de ratos com artrite por adjuvante com o β -cariofileno na dose de 430 mg Kg⁻¹ sobre a inflamação e o estresse oxidativo hepático. O tratamento foi eficaz em reduzir o edema das patas, mas não as lesões secundárias sistêmicas devido à artrite. Em adição, o tratamento diminuiu o estresse oxidativo hepático. Desta forma, é possível que o β -cariofileno seja um composto útil para o tratamento da artrite reumatoide em humanos.

Introdução

O β -cariofileno é um sesquiterpeno natural que apresenta diversas propriedades terapêuticas, especialmente atividade anti-inflamatória. É o principal constituinte do óleo de copaíba, um dos mais importantes fitoterápicos da Amazônia brasileira, podendo atingir até 50% do seu conteúdo (VEIGA et al., 2007). O óleo de copaíba extraído da espécie *Copaifera reticulata* Ducke foi capaz de atenuar as manifestações inflamatórias articulares e sistêmicas em ratos com artrite induzida por adjuvante. Este último é um modelo experimental de inflamação crônica que compartilha muitas características da artrite reumatoide em humanos e, por isso, muito utilizado para avaliar a ação de compostos anti-inflamatórios e antirreumáticos (COMAR et al., 2013). O óleo de copaíba adicionalmente atenuou o estresse oxidativo hepático, que está bastante acentuado nos animais artríticos (CASTRO et al., 2017). Entretanto, estes efeitos foram associados com ação hepatotóxica do óleo, a qual foi atribuída principalmente ao seu conteúdo de compostos diterpênicos.

O β -cariofileno parece ser o responsável pela atividade anti-inflamatória do óleo de copaíba, entretanto, ainda é incerto se também é responsável pela atividade antioxidante. Em adição, como o β -cariofileno é o principal constituinte do óleo de copaíba, se comprovado seus efeitos anti-inflamatórios e antioxidantes, seria de interesse viabilizar a sua obtenção a partir do óleo de copaíba, que é a sua principal fonte natural, e investigar suas possíveis ações terapêuticas sobre a artrite reumatoide.

Considerando as propriedades do β -cariofileno acima descritas, o presente estudo tem como objetivo avaliar seus efeitos sobre a inflamação articular e sistêmica e o estresse oxidativo hepático em ratos com artrite induzida por adjuvante.

Materiais e métodos

A artrite foi induzida pela injeção do adjuvante completo de Freund (500 μ g) na pata traseira esquerda de ratos da linhagem Holtzman com aproximadamente 60 dias de vida. Ratos com a mesma idade foram utilizados como controle. Os animais foram aleatoriamente divididos em 5 grupos: CT, controles + óleo de milho; CT β , controles + β -cariofileno 430 mg Kg⁻¹; AIA, artríticos + óleo de milho; AIA β , artríticos + β -cariofileno; AIBU, artríticos + ibuprofeno 30 mg Kg⁻¹. O tratamento foi feito por via oral (gavagem) durante cinco dias antes da indução da artrite e por mais 18 dias. No 19º dia os animais foram eutanasiados. Este projeto foi previamente aprovado pelo Comitê de Conduta Ética no Uso de Animais em Experimentação - CEAE, da UEM (Parecer 007/2015).

O efeito anti-inflamatório do β -cariofileno foi avaliado por meio de alterações no volume das patas e escore de lesões secundárias à artrite. Para avaliar o efeito do β -cariofileno sobre o estado oxidativo, os fígados dos animais previamente anestesiados foram removidos, clampeados em nitrogênio líquido e homogeneizado em Van Potter-Elvhjem com 10 volumes de tampão fosfato de potássio 0,1 M (pH 7,4). O homogenato resultante foi centrifugado (11000g/15 min) e o sobrenadante utilizado para determinar os níveis de proteínas carboniladas, espécies reativas de oxigênio (ROS), glutathiona reduzida (GSH) e oxidada (GSSG) e atividade das enzimas catalase e superóxido dismutase (SOD).

Resultados e Discussão

A Tabela 1 mostra os parâmetros anti-inflamatórios e de estresse oxidativo. O volume médio das patas antes da indução da artrite foi de 1,46 $\pm$ 0,1 ml. O aumento no volume (Δ vol) das patas injetadas foram, respectivamente, 301%, 208% e 167% maiores que os iniciais, para os animais artrítico não tratados, tratados com β -cariofileno e tratados com ibuprofeno. Os volumes da pata injetada foram 31 e 43,7% menores nos animais artríticos tratados com β -cariofileno e o ibuprofeno, respectivamente (comparados aos artríticos não tratados). O aumento no volume (Δ vol) das patas não injetadas foram, 161%, 70% e 82% maiores que os iniciais,

respectivamente, para os animais artrítico não tratados, tratados com β -cariofileno e tratados com ibuprofeno. No 18º dia, o incremento no volume da pata contralateral foi 56 e 49% menor, respectivamente, para os animais tratados com β -cariofileno e ibuprofeno (comparados aos artríticos não tratados). O tratamento com o β -cariofileno não foi efetivo em reduzir o escore das lesões secundárias à artrite, em contrapartida o tratamento com ibuprofeno reduziu em 20% este parâmetro.

Tabela1: Efeitos do β -cariofileno sobre os parâmetros inflamatórios e de estresse oxidativo hepático em ratos controles e artríticos.

Parâmetros	Grupos				
	CT	CT β	AIA	AIA β	AIBU
Δ vol (mL) (pata esq.)	---	---	4,4 $\pm$ 0,3 ^a	3,0 $\pm$ 0,3 ^b	2,4 $\pm$ 0,1 ^b
Δ vol (mL) (pata dir.)	---	---	2,4 $\pm$ 0,2 ^a	1,0 $\pm$ 0,3 ^b	1,2 $\pm$ 0,2 ^b
Escore artrítico	---	---	5,0 $\pm$ 0,5 ^a	4,8 $\pm$ 0,2 ^a	4,0 $\pm$ 0,4 ^b
Prot. Carb. (nmol mg ⁻¹)	5,4 $\pm$ 0,3 ^a	5,6 $\pm$ 0,4 ^{ab}	7,5 $\pm$ 0,4 ^c	5,5 $\pm$ 0,5 ^a	7,3 $\pm$ 0,2 ^{bcd}
ROS (nmol mg ⁻¹)	0,9 $\pm$ 0,1 ^a	0,9 $\pm$ 0,1 ^a	1,8 $\pm$ 0,1 ^b	1,3 $\pm$ 0,1 ^{ac}	1,4 $\pm$ 0,1 ^c
GSH (nmol mg ⁻¹)	12,9 $\pm$ 0,6 ^a	9,6 $\pm$ 0,3 ^{ac}	5,0 $\pm$ 1,2 ^b	8,5 $\pm$ 0,3 ^c	10,4 $\pm$ 0,5 ^{ac}
GSSG (nmol mg ⁻¹)	1,4 $\pm$ 0,1 ^a	1,5 $\pm$ 0,3 ^a	2,5 $\pm$ 0,2 ^b	1,7 $\pm$ 0,1 ^a	3,2 $\pm$ 0,3 ^b
GSH/GSSG	9,4 $\pm$ 0,6 ^a	6,9 $\pm$ 1,3 ^b	2,2 $\pm$ 0,9 ^c	5,0 $\pm$ 0,3 ^{bd}	3,3 $\pm$ 0,5 ^{cd}
Catalase (nmol min ⁻¹)	1116 $\pm$ 45 ^a	990 $\pm$ 140 ^a	251 $\pm$ 21 ^b	305 $\pm$ 37 ^b	250 $\pm$ 34 ^b
SOD (U mg ⁻¹)	2,8 $\pm$ 0,2 ^a	2,0 $\pm$ 0,2 ^a	1,7 $\pm$ 0,2 ^b	2,2 $\pm$ 0,1 ^{ab}	2,2 $\pm$ 0,2 ^{ab}

O volume inicial das patas foi 1,46 $\pm$ 0,1 ml. Δ vol das patas = volume no dia 18 – volume inicial, expressados como mL. CT, controles; CT β , controles tratados com β -Cariofileno 430 mg Kg⁻¹ dia⁻¹; AIA, artrite induzida por adjuvante; AIA β , artrite induzida por adjuvante tratada com β -Cariofileno 430 mg Kg⁻¹ dia⁻¹; AIBU, artrite induzida por adjuvante tratada com ibuprofeno 35 mg Kg⁻¹ dia⁻¹. Prot. Carb., proteínas carboniladas. Os dados representam a média $\pm$ erro padrão da média de 3-5 animais. Os valores com letras sobrescritas diferentes na mesma linha diferem estatisticamente (p <0,05).

Os níveis de proteínas carboniladas foram utilizados para avaliar o dano oxidativo hepático e foram 39% maiores nos ratos artríticos (comparados aos controles). O tratamento com o β -cariofileno foi capaz de reduzir os níveis de proteínas carboniladas aos mesmos que dos animais controle, por outro lado, o tratamento com ibuprofeno não melhorou este parâmetro. Os níveis de ROS foram 100% maiores nos ratos artríticos (comparados aos controles) e o tratamento com β -cariofileno e ibuprofeno

reduziram estes níveis, respectivamente, em 27 e 22%. O tratamento dos ratos controles com β -cariofileno não modificou os níveis de proteínas carboniladas e ROS no fígado. Os níveis de glutathiona reduzida (GSH) e oxidada (GSSG) e atividade das enzimas catalase e SOD foram utilizados como parâmetros antioxidantes hepáticos. Os níveis de GSH foram 61% menor no fígado de ratos artríticos, o que causou uma diminuição de 76% na razão GSH/GSSG. O tratamento com o β -cariofileno foi capaz de elevar os níveis de GSH e a razão GSH/GSSG em 70 e 127% respectivamente. A atividade das enzimas catalase e superóxido dismutase foram reduzidas pela inflamação (-77 e -39%, respectivamente), já os tratamentos não foram capazes de recuperar suas atividades.

Conclusões

Os resultados do presente trabalho mostraram que o tratamento com o β -cariofileno na concentração de 430 mg Kg⁻¹ foi capaz de diminuir a inflamação articular, mas não a sistêmicas em ratos com artrite por adjuvante. O estresse oxidativo hepático foi também reduzido com o tratamento a parece ser devido ao aumento dos conteúdos de GSH. Estudos complementares são necessários, no entanto, para avaliar o mecanismo de ação e possível toxicidade do β -cariofileno. Em adição, os efeitos devem ser investigados utilizando menores doses β -cariofileno, de forma a viabilizar estudos clínicos para utilização como um auxiliar no tratamento da artrite reumatoide em humanos.

Agradecimentos

A Fundação Araucária pelo fomento e incentivo dados à pesquisa científica.

Referências

CASTRO-GHIZONI, C.V.; AMES, A.P.A.; LAMEIRA, O.A.; BERSANI-AMADO, C.A.; SÁ-NAKANISHI, A.B.; BRACHT, L.; NATALI, M.R.M.; PERALTA, R.M.; BRACHT A.; COMAR, J.F. Anti-inflammatory and antioxidant actions of copaiba oil are related to liver cell modifications in arthritic rats. **J Cell Biochem**, Maringá, v. n/a p. n/a, 2017.

COMAR, J.C.; DE SÁ-NAKANISHI, A.B.; DE OLIVEIRA, A.L.; WENDT, M.M.N.; BERSANI-AMADO, C.A.; ISHII-IWAMOTO, E.L.; PERALTA, R.M.; BRACHT, A. Oxidative state of the liver of rats with adjuvant-induced arthritis. **Free Rad Biol Med**, Maringá, v.58, p. 144-153, 2013.

VEIGA JUNIOR, V.F.; ROSAS, E.C.; CARVALHO, M.V.; HENRIQUES M.G.; PINTO, A.C. Chemical composition and anti-inflammatory activity of copaiba oils from *Copaifera cearensis* Huber ex Ducke, *Copaifera reticulata* Ducke and *Copaifera multijuga* Hayne-a comparative study. **J Ethnopharmacol**, Manaus, v. 112, n. 2, p. 248-254, 2007.