RELAÇÃO ENTRE A TAXA METABÓLICA BASAL (TMB) E OS FENÓTIPOS METABOLICAMENTE SAUDÁVEIS (MHO) E NÃO SAUDÁVEIS (MUO) DE ADOLESCENTES COM EXCESSO DE PESO INGRESSANTES EM UM PROGRAMA MULTIPROFISSIONAL DE TRATAMENTO DA OBESIDADE (PMTO).

Geovanni Marcos de Oliveira¹, Greice Westphal², Igor Alisson Spagnol Pereira², Regina Alves Thon², Michele Fernandes do Amaral³, Nelson Nardo Júnior⁴
e-mail: njunior@uem.br

¹Graduando do curso de Educação Física da Universidade Estadual de Maringá – UEM

²Discente do Programa de Pós-Graduação Associado em Educação Física UEM/UEL da Universidade Estadual de Maringá – UEM

³Docente do curso de Graduação em Psicologia do Centro Universitário Metropolitano de Maringá – UNIFAMMA

⁴Docente dos cursos de Graduação e Pós-Graduação em Educação Física da Universidade Estadual de Maringá – UEM

Ciências da Saúde – Educação Física

Palavras-chave: Gasto energético; Metabolismo Basal; Obesidade.

Resumo:

A obesidade tem aumentado consideravelmente nos últimos anos, tornando-se um grave problema de saúde pública. O desenvolvimento da obesidade está associado a um crônico balanço energético positivo, causado pelo excesso de ingestão energética e reduzido dispêndio energético. Apesar de serem reconhecidos os fenótipos de obesos metabolicamente saudáveis (MHO) e os metabolicamente não saudáveis (MUO) não há estudos sobre a relação da taxa metabólica basal (TMB) e esses fenótipos. Com isso, o objetivo deste estudo é investigar a relação da TMB em adolescentes com excesso de peso (sobrepeso e obesidade) com os fenótipos MHO ou MUO, ingressantes em um Programa Multiprofissional de Tratamento da Obesidade (PMTO). Trata-se de um ensaio clínico pragmático, retrospectivo de corte transversal com 50 adolescentes com excesso de peso, de ambos os sexos, com idade entre 15 e 18 anos. Para tanto, foram avaliados parâmetros antropométricos (peso, altura, IMC, CC), de composição corporal, parâmetros bioquímicos, além da avaliação da TMB e categorização dos fenótipos. A frequência do fenótipo MUO foi 36% contra 64% de MHO. Valores significativamente inferiores ($p < 0,05$) foram observados no grupo MHO para as variáveis VLDL-c, Triglicerídeos, não-HDL-c, Insulina e HOMA-IR. Também houve diferenças significativas, na mesma direção (menores valores no grupo MHO) para a TMB e o IMC. Dessa forma constatou-se uma relação ($R_s = 0,72$) entre as variáveis de acordo com o fenótipo MHO ou MUO nessa população.

Introdução

As altas taxas de sobrepeso e obesidade vêm sendo considerados um grave problema de saúde pública na maior parte do mundo. Como consequência, o risco de morbimortalidade por doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) é aumentado impactando diretamente nos sistemas de saúde, tanto em países desenvolvidos como nos em desenvolvimento (WHO, 2019). No Brasil, a prevalência de excesso de peso em jovens chega a atingir 24,3% e 22,1% do sexo feminino e masculino respectivamente, sendo classificados entre sobrepeso e obesidade (NG et al., 2014).

Há indivíduos que apresentam obesidade, mas não manifestam resistência à insulina, distúrbios lipídicos ou hipertensão arterial e assim são considerados “*metabolically healthy obese*” (MHO), isto é, obesos metabolicamente saudáveis, contrapondo-se aos “*metabolically unhealthy obese*” (MUO), que são aqueles obesos metabolicamente não saudáveis. A partir dessa definição entende-se que a população com o fenótipo MUO apresenta maior risco para o desenvolvimento de DCNTs, enquanto que a população com o fenótipo MHO apresenta maior risco comparado com indivíduos eutróficos (ARNLOV, 2010). Apesar disso, não encontrou-se estudos que relacionam a TMB de acordo com esses fenótipos. Dessa forma, o objetivo desse estudo foi comparar a TMB de adolescentes com excesso de peso categorizados de acordo com os fenótipos MHO ou MUO.

Materiais e métodos

O estudo caracteriza-se como um ensaio clínico pragmático, descritivo, retrospectivo com corte transversal, com 50 adolescentes com faixa etária entre 15 e 18 anos, ingressantes em um Programa Multiprofissional de Tratamento da Obesidade (PMTO) oferecido pelo NEMO/HUM/UEM.

A massa corporal (Kg) foi avaliada por meio de um aparelho de bioimpedância octapolar multifrequencial (InBody modelo 520). A medida da estatura dos indivíduos ocorreu por meio de um estadiômetro de parede (Sanny). O índice de massa corporal (IMC) foi calculado a partir da divisão da massa corporal (Kg) pela estatura (m) ao quadrado.

A TMB foi determinada por meio de um Analisador de Gases Metabólicos (VO2000, Software Aerograph, USA). Esses dados foram expressos em Kcal/dia. As coletas de sangue foram realizadas a partir de punção venosa periférica e armazenadas em tubos estéreis de plástico, contendo (gel, fluoreto ou EDTA), com o participante na condição de jejum de 10 a 12 horas. A resistência à insulina foi avaliada pelo *Homeostasis Model Assessment Insulin- Resistance Index* (HOMA-IR). O HOMA-IR foi determinado pela fórmula: $HOMA-IR = [(FPI \mu U/ml \times FPG \text{ mmol/l})/22,5]$ no qual são utilizados os valores de glicemia e insulina em jejum.

Para definição dos fenótipos MHO e MUO utilizamos a classificação de Resistência à Insulina (MHO-RI), por meio do HOMA-IR, tendo como ponto de corte o valor de $\geq 3,16$.

Para análise dos dados utilizou-se o software SPSS, versão 20.0 e o teste de *Kolmogorov-Smirnov* para a normalidade dos dados. Como os dados não apresentaram distribuição normal foi utilizado o teste U de Mann-Whitney para a comparação do TMB entre os grupos MHO e MUO. Para identificar a correlação entre as variáveis TMB e IMC utilizou-se o teste de *Sperman* e foi considerado o valor de $p < 0,05$.

Resultados e Discussão

No presente estudo foram incluídos 50 adolescentes com excesso de peso. As meninas representaram 64% da amostra ($n=32$) e os meninos 36% ($n=18$), a média de idade foi de 17 anos ($\pm 0,9$ anos), a média do peso ficou entre 89,39 Kg ($\pm 22,75$ kg) e a estatura dos adolescentes foi de 168 cm. ($\pm 9,08$ cm) Em relação ao IMC os adolescentes apresentaram valor médio de $31,33 \text{ kg/m}^2$, tendo sido classificados como com sobrepeso 56% dos participantes ou obesidade 44% do grupo.

Resultados:

Tabela 1: Apresentação da mediana da TMB e do IMC do Grupo I (MUO) e Grupo II (MHO)

	Taxa de TMB (kcal/dia)
Grupo I (não saudável/MUO) N=18	1942,28*(1613,59; 2156,96)
Grupo II (saudável/MHO) N=32	1696,85(1521,23; 2065,43)
	IMC (Kg/m^2)
Grupo I (não saudável/MUO) N=18	36,10*(27,57; 38,57)
Grupo II (saudável/MHO) N=32	27,80(23,22; 31,05)

TMB: taxa metabólica basal IMC: índice de massa corporal *U Mann Whitney: TMB ($p=0,039$) e IMC ($p=0,031$)

A mediana da TMB dos metabolicamente saudáveis foi de 1696,85(kcal/dia) e entre os não saudáveis apresentou um valor de 1942,28(kcal/dia). Por outro lado, a mediana do IMC dos adolescentes (MHO) foi de 27,8(Kg/m^2) e dos (MUO), foi de 36,1(Kg/m^2), demonstrando grau variado de excesso de peso.

O estudo mais recente encontrado na literatura realizado por Marra (2018), avaliou a resistência à insulina por meio do HOMA-IR em 418 adolescentes obesos no Brasil, 217 (51,9%) do sexo feminino e 201 (48,1%) do sexo masculino, para estimar a prevalência do fenótipo MUO, desses 253 (73,5%) foram caracterizado como MUO. Enquanto que em nossa pesquisa apenas verificou-se este fenótipo em 36% ($n=18$) dos adolescentes que foram classificados como MUO.

No mesmo estudo acima citado, Marra (2018) aponta limitações em na utilização dos valores sugeridos pelo IDF, HOMA-IR, citando que não foi possível verificar a associação entre a atividade física e o desfecho citado. Apesar disso em nosso estudo foi utilizado o mesmo método de classificação ao utilizar o ponto de corte definido pelo IDF HOMA-IR como parâmetro de classificação dos adolescentes nos fenótipos MHO ou MUO.

Em nosso estudo, contudo, analisou-se a relação entre o IMC e a TMB que ainda não haviam sido descritos na literatura. Assim, acreditamos ter contribuído com a apresentação de mais parâmetros e relações entre essas variáveis, do mesmo modo que fizeram Pajunen et al (2011), em um trabalho realizado na Finlândia que também identificou o IMC elevado com maiores níveis de gordura hepática em adolescentes de ambos os sexos, sendo essa população classificada como tendo um fenótipo MUO.

Conclusões

A TMB e o IMC dos adolescentes classificados com o fenótipo MUO apresentaram diferença significativa (maior valores) quando comparados ao grupo MHO.

Ao participar de um PMTO, o aumento da atividade física pode proporcionar uma diminuição dos fenótipos MUO dos adolescentes que aderiram ao programa. Para isso novas pesquisas são necessárias.

Além disso, é necessária maior ênfase na promoção de políticas públicas dirigidas à redução de comportamentos e fatores de risco. Sobretudo por já terem sido identificados nessa faixa etária importante proporção de adolescentes MUO, que de outro modo não teriam conhecimento dessa condição.

Agradecimentos

Agradeço primeiramente a Deus pela oportunidade de realizar esse trabalho, a agência de fomento CNPq, pelo incentivo à pesquisa no Brasil, ao meu orientador Nelson Nardo Júnior, pelo conhecimento que a mim foi passado na realização dessa pesquisa, e aos integrantes do Núcleo de Estudos Multiprofissional da Obesidade - NEMO, que ajudaram direta e indiretamente para a realização desse trabalho.

Referências

ARNLOV, J. et al. Impact of body mass index and the metabolic syndrome on the risk of cardiovascular disease and death in middle-aged men. **Circulation**, v. 121, n. 2, p. 230-236, 2010.

NG, M. et al. Global, regional, and national prevalence of overweight and obesity in children and adults during 1980–2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013. **The Lancet**, v. 384, n. 9945, p. 766-781, 2014.

PAJUNEN. P. et al. Metabolically healthy and unhealthy obesity phenotypes in the general population: the FIN-D2D Survey. **BMC Public Health**.V.11, N.754, 2011.

WHO. WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Obesity and overweight**. Disponível em: < <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/index.html> >. Acesso em: 26 jul. 2019.

MARRA. N. F. Prevalência e fatores associados do fenótipo “obesidade metabólica benigna” em uma população de adolescentes obesos atendidos na Liga de Obesidade Infantil HC-FMUSP. 2018. **Dissertação (Mestrado em Medicina Preventiva) – Faculdade de Medicina, University of São Paulo**. Disponível em < <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/5/5137/tde-28092018-083856/en.php> >. Acesso em 30 jul. 2019