PERFIL DE TOLERÂNCIA DE *Candida albicans* AO ESTRESSE OXIDATIVO OCASIONADO POR EXPOSIÇÕES SUCESSIVAS À INATIVAÇÃO FOTODINÂMICA COM HIPERICINA.

Camila Dutra de Castro (PIBIC/CNPq/FA/UEM), Tiago de Paula Bianchi (PIBIC/CNPq/FA/UEM), Glauca Sayuri Arita (PBF/DAB/UEM), Renato Sonchini Gonçalves (DQI/UFMA), Wilker Caetano (DQI/UEM), Patrícia de Souza Bonfim de Mendonça (Coorientador) Terezinha Estivalet Svidzinski (Orientador).
E-mail: terezinha.svidzinski@gmail.com.

Universidade Estadual de Maringá, Centro de Ciências da Saúde, Maringá, PR.

Microbiologia; Microbiologia Aplicada/ Microbiologia Médica.

Palavras-chave: terapia fotodinâmica; sensibilidade; peróxido de hidrogênio

RESUMO

A terapia fotodinâmica pode ser utilizada como uma importante alternativa para o tratamento de doenças infecciosas, dentre elas as infecções fúngicas. A técnica apresenta como ponto chave a inativação fotodinâmica (IFD), por meio de uma fonte de luz, fotossensibilizador e oxigênio. Esse conjunto pode gerar espécies reativas de oxigênio (ERO), lesivas para as células. Apesar da técnica possuir baixas chances de resistência, é necessário o conhecimento dessa possibilidade, visto a utilização de exposições sucessivas para erradicação de um determinado patógeno. Portanto, o presente trabalho avaliou o perfil de tolerância ou resistência de *Candida albicans* após exposições sucessivas a IFD+hip-P123 (hipericina nanoencapsulada com P123), analisando em conjunto a sensibilidade das células tratadas ao peróxido de hidrogênio. A dinâmica ao longo das exposições não determinou um padrão contínuo de inibição fúngica, evidenciando uma pequena oscilação entre o perfil de sensibilidade. No sétimo tratamento ocorreu um aumento da concentração inibitória mínima para 2 μ M de hip-P123 (primeira exposição foi de 1 μ M de hip-P123). Mas não foi um perfil persistente, indicando ausência de tolerância. Na 15ª exposição, as leveduras apresentaram um perfil mais sensível do que as outras exposições, com CIM de 0.5 μ M de hip-P123. Além disso, essas leveduras ficaram mais sensíveis a um ambiente estressor na presença de peróxido de hidrogênio, indicando que a IFD alterou outras características de susceptibilidade das células fúngicas. Dessa forma, os tratamentos sucessivos utilizando IFD+hip-P123 não induziu tolerância ou resistência em *C. albicans*, e as células ficaram mais sensíveis à ERO.

INTRODUÇÃO

A inativação fotodinâmica (IFD) envolve um processo fotoquímico onde ocorre a excitação de uma molécula fotoativa, denominada fotossensibilizador (FS), no qual apresenta uma fonte luminosa de comprimento de onda respectivo a faixa de

absorção do composto (Cieplik *et al.* 2018). A geração de espécies reativas de oxigênio (ERO), causa danos em determinadas estruturas celulares de patógenos. Entre os FS, a hipericina vem se destacando com importante atividade antifúngica (Galinari *et al.* 2022). Apesar de a interação das ERO_s geradas na IFD com uma ampla gama de alvos intracelulares minimizar as chances de resistência, a necessidade de repetidas aplicações para erradicar um determinado patógeno vai de encontro com essa questão (Rapacka-Zdonczyk *et al.* 2021). É necessário conhecer outros aspectos além da atividade antifúngica da IFD, considerando a importância da avaliação do risco de desenvolvimento de tolerância ou resistência durante o tratamento. Dessa forma, o presente estudo analisou a tolerância ou resistência de *Candida albicans* após sucessivas exposições a IFD com hipericina nanoencapsulada em *Pluronic*® P123 (hip-P123), além de analisar estrategicamente a sensibilidade da levedura ao peróxido de hidrogênio após o tratamento.

MATERIAIS E MÉTODOS

Microrganismo

Foi utilizado uma cepa padrão de *Candida albicans* ATCC 90028, armazenada pelo Laboratório de Micologia Médica, UEM, a -80 °C.

Fotossensibilizador e Fonte Luminosa

A hipericina foi sintetizada pelo Núcleo de Pesquisa em Sistemas Fotodinâmicos (NUPESF) da UEM.

Teste de suscetibilidade in vitro da hip-P123 com IFD

Foi preparado uma suspensão de leveduras *Candida albicans* cultivadas em salina (85%), utilizando a concentração de 1×10^6 unidades formadoras de colônia (UFC)/ml nos ensaios. A hip-P123 (8 a 0.125 $\mu\text{mol/L}$) foi adicionada a uma placa de poliestireno de 96 poços juntamente com o inóculo padronizado, incubada no escuro por duas horas e posteriormente iluminada com fluência de 37.8 J/cm^2 por 20 minutos. Foram incluídos dois controles fúngicos, ou seja, na presença (CFI) e ausência de luz (CF). Após esse processo uma alíquota de 20 μl de cada concentração de hip-P123 e dos dois controles foram semeadas em SDA, onde após 24 horas foi avaliada a atividade antifúngica por meio da contagem das UFC. Para a concentração inibitória mínima (CIM) foi considerada aquela com uma redução $\geq 2 \log_{10}$ UFC/mL. Foram realizados dois testes independentes, sendo conduzidos em duplicata.

Indução da tolerância/ resistência in vitro de C. albicans à IFD com hip-P123

Após o teste de susceptibilidade, as colônias presentes em uma alíquota da concentração subinibitória (SUB-CIM) apresentando uma redução de $1-2 \log_{10}$ UFC/mL foram aplicadas ao inóculo para compor o próximo teste, processo realizado quinze vezes em intervalos de 36 horas.

Indução do perfil de sensibilidade ao peróxido de hidrogênio (H_2O_2)

As suspensões das leveduras testadas foram preparadas em PBS após 24 horas de tratamento (1×10^6 UFC/mL), diluídas em série e semeadas em *Yeast Extract Peptone Dextrose Ágar* (YPD) contendo 2 mmol/L de peróxido de hidrogênio (H_2O_2). As placas foram incubadas a 35°C por 24 horas juntamente com uma placa controle de YPD sem H_2O_2 e o resultado obtido semi-quantitativamente, frente ao crescimento nas diluições. A sensibilidade ao H_2O_2 foi testada na 1ª, 5ª, 10ª e 15ª exposição a IFD com hip-P123 e pontualmente no 7º e 8º tratamento.

Análise Estatística

Os dados foram submetidos a análise estatística pelo programa *GraphPad Prism 8.0*®, de acordo com o *one-way ANOVA*, seguido pelo teste de *Tukey*. Os valores foram considerados estatisticamente significativos quando apresentaram $p < 0.05$.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A dinâmica ao longo das exposições não determinou um padrão contínuo de inibição, evidenciando uma oscilação entre o aumento e perda de sensibilidade. A atividade antifúngica da 1ª a 4ª exposição a IFD com hip-P123 obteve uma CIM de 1 $\mu\text{mol/L}$ (figura 1-A). As leveduras apresentaram uma maior sensibilidade no 5º teste, visto que a CIM foi reduzida para 0.5 $\mu\text{mol/L}$. A 7ª exposição obteve um aumento da CIM para 2 $\mu\text{mol/L}$, indicando um possível fenômeno de persistência fúngica, onde as células persistentes apresentaram baixa ou inexistente taxa de replicação em resposta ao microambiente hostil. Como demonstrado por Rapacka-Zdonczyk *et al.* 2021, esse fenótipo é transitório e pode desaparecer nas exposições seguintes. Neste trabalho observamos que a CIM reduziu para 0.5 $\mu\text{mol/L}$ ao final do 10º tratamento, parâmetro esse mantido até o último tratamento (figura 1-B). Sendo assim, é possível descartar que houve resistência, pois a aplicação de parâmetros mais extremos de fotoinativação, ou seja, de maior concentração de hip-P123, promoveu a erradicação completa da população fúngica (Rapacka-Zdonczyk *et al.* 2019). O teste de sensibilidade ao peróxido de hidrogênio foi testado durante as exposições em momentos estratégicos com o intuito de determinar um mecanismo envolvido na tolerância. Não foi identificada resistência das leveduras ao H_2O_2 , incluindo as recuperadas que apresentaram aumento da CIM. O fungo utilizado na 1ª e 5ª exposição demonstrou ser sensível ao H_2O_2 devido a inibição do crescimento a partir da 10^5 na ordem de 50%, evoluindo para inibição total em 10^3 em comparação ao controle. Após sete e oito tratamentos, as leveduras passaram a ser mais sensíveis ao H_2O_2 apresentando inibição superior a 90% na ordem de 10^5 , atingindo ausência de crescimento em 10^4 . Na 15ª exposição uma inibição de 70% pode ser identificada em 10^5 e uma redução total das colônias em 10^4 , igualmente ao 7º e 8º tratamento, evidenciando uma alta sensibilidade ao composto oxidante.

Figura 1 – Resultados representativos das exposições de *Candida albicans* à Inativação Fotodinâmica associada a hipericina nanoencapsulada com P123. A) Avaliação da concentração inibitória mínima (CIM) na 1ª exposição e B) 15ª exposição. * $p < 0.05$.

CONCLUSÕES

Após quinze exposições da IFD + hip-P123 foi possível concluir que este tratamento não induziu tolerância ou resistência em *Candida albicans*.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos a Fundação Araucária pela atribuição da bolsa e ao Laboratório de Micologia Médica/UEM pelo apoio durante todo o processo.

REFERÊNCIAS

CIEPLIK, F.; DENG, D.; CRIELAARD, W.; BUCHALLA, W.; HELLWIG, E.; AL-AHMAD A.; MAISCH, T. Antimicrobial photodynamic therapy - what we know and what we don't. **Crit Rev Microbiol**, v. 44, n. 5, p. 571-589, sep 2018. DOI: 10.1080/1040841X.2018.1467876 Disponível em: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1040841X.2018.1467876>. Acesso em: 8 ago. 2023.

GALINARI, C. B.; BIANCHI, T. P.; GONÇALVES, R. S.; CESAR, G. B.; BERGMANN, E. V.; MALACARNE, L. C.; KIOSHIMA COTICÁ, É.; BONFIM-MENDONÇA, P. S.; SVIDZINSKI, T. I. E. Photoactivity of hypericin: from natural product to antifungal application. **Crit Rev Microbiol**, v. 49, n. 1, p. 38-56, feb, 2022. DOI: 10.1080/1040841X.2022.2036100. Disponível em: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1040841X.2022.2036100>. Acesso em: 15 ago. 2023.

RAPACKA-ZDONCZYK, A.; WOZNIAK, A.; NAKONIECZNA, J.; GRINHOLC, M. Development of Antimicrobial Phototreatment Tolerance: Why the Methodology Matters. **Int J Mol Sci**, v. 22, n. 4, feb, 2021. DOI: 10.3390/ijms22042224. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7926562/>. Acesso em: 15 ago. 2023.

RAPACKA-ZDONCZYK, A.; WOZNIAK, A.; PIERANSKI, M.; WOZIWODZKA, A.; BIELAWSKI, K. P.; GRINHOLC, M. Development of *Staphylococcus aureus* tolerance to antimicrobial photodynamic inactivation and antimicrobial blue light upon sub-lethal treatment. **Sci Rep**, jul, 2019. DOI: 10.1038/s41598-019-45962-x. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6603016/>. Acesso em: 16 ago. 2023.